

Table 1 Percentage Distribution of Neogene Silicoflagellates and Relative Abundances of Some Coccolithophorids of Sado Island, Niigata Prefecture, Japan

Series		Upper Miocene																									Pliocene																		TSUBAKI			
Rock Units		Tsurushi Formation		Nakayama Formation																									Sawane Formation																		TSUBAKI	
Biostratigraphic Units	Silicoflagellata			Dist. speculum Zone																									Kawachi Formation																		TSUBAKI	
Coccolith phrid	Dist. speculum Zone																										Variable Zone																		TSUBAKI			
Sample Number		Dist. speculum Zone																									Dist. crux speculum Zone																		TSUBAKI			
Species		AIKAWA																									AIKAWA																		TSUBAKI			
SILICOFLAGELLATA		AIKAWA																									AIKAWA																		TSUBAKI			
<i>Lyramura</i> sp.		AIKAWA																									AIKAWA																		TSUBAKI			
<i>Mesocena</i> circulus		AIKAWA																									AIKAWA																		TSUBAKI			
<i>M.</i> diodon		AIKAWA																									AIKAWA																		TSUBAKI			
<i>M.</i> triangula		AIKAWA																									AIKAWA																		TSUBAKI			
<i>M.</i> quadrangula		AIKAWA																									AIKAWA																		TSUBAKI			
<i>M.</i> elliptica var. quadrangula		AIKAWA																									AIKAWA																		TSUBAKI			
<i>M.</i> pentagona		AIKAWA																									AIKAWA																		TSUBAKI			
<i>M.</i> hexagona		AIKAWA																									AIKAWA																		TSUBAKI			
<i>Mesocena</i> (?) <i>sadonica</i> n. sp.		AIKAWA																									AIKAWA																		TSUBAKI			
<i>Dictyocha triacantha</i>		AIKAWA																									AIKAWA																		TSUBAKI			
<i>D. triacantha</i> var. <i>apiculata</i>		AIKAWA																																														